



















GREIX

 <p>Depressió furcular: Sense greix/traça molt fina</p> <p>Abdomen: Sense greix</p>	 <p>0</p>
 <p>Depressió furcular: Fins a la meitat de l'àrea coberta de greix</p> <p>Abdomen: Traces de greix</p>	 <p>1</p>
 <p>Depressió furcular: Àrea totalment coberta/cavitat encara molt buida</p> <p>Abdomen: Bandes de greix ben marcades entre els intestins</p>	 <p>2</p>
 <p>Depressió furcular: Cavitat força plena/el greix arriba fins a les vores de les interclavícules</p> <p>Abdomen: El greix forma una placa fina i contínua (fetge i part dels intestins encara visibles)</p>	 <p>3</p>
 <p>Depressió furcular: Cavitat plena/el greix cobreix l'extrem distal de les interclavícules</p> <p>Abdomen: Placa gruixuda que cobreix tot o bona part de l'abdomen (el fetge encara pot ser visible)</p>	 <p>4</p>
 <p>Depressió furcular: El greix s'acumula per sobre de la cavitat (pot cobrir el marge superior dels músculs)</p> <p>Abdomen: Placa molt gruixuda i prominent que cobreix tot l'abdomen (pot cobrir el marge inferior dels músculs)</p>	 <p>5</p>
 <p>El greix cobreix la part superior i inferior de la musculatura</p>	 <p>6</p>
 <p>3/4 dels músculs coberts</p>	 <p>7</p>
 <p>Músculs totalment coberts</p>	 <p>8</p>
Desconegut	9

FULL DE CODIS











Standards d'anellament



Institut Català d'Ornitologia

EXTENSIÓ DE LA MUDA

MUDA COMPLETA	
Codi	nº Primàries mudades
0	0
1	1
2	2-3
3	4-6
4	7-8
5	9-10
9	Desconegut

MUDA PARCIAL		
0	0% Mudat	
1		
2		
3		
4		
5		
9	Desconegut	

MÈTODE DE CAPTURA

Codi	Mètode de captura
XP	Xarxa japonesa - passeriformes (costat malla <=1,6 cm)
XL	Xarxa japonesa - limícoles (costat malla >1,6 cm)
YU	Trampa Yunick o similar
BA	Ballesta
HE	Helgoland o similar
MP	Trampa-menjadora (tipus pàrids) o similar
NA	Nasses limícoles o similar
CA	Xarxa canó o similar
LL	Xarxa de tipus llaç
TE	Xarxa de terra
TR	Xarxa de trasmall o horitzontal
AL	Altres trampes
NI	Al niu (caixa niu o similar)
NV	Per no poder volar
DO	Mentre està dormint
MA	Amb la mà (amb salabre, enlluernament)
RH	Hacking (només centres de recuperació)
RS	Cross-fostering (només centres de recuperació)
RF	Fostering (només centres de recuperació)
RG	Gàbia d'aclimatació (només centres de recuperació)
RA	Altres mètodes (només centres de recuperació)

RECLAM

Codi	Reclam
0	Aparentment no ha estat atret pel reclam
1	Aparentment ha estat atret pel reclam
2	Capturat a la xarxa del reclam atret pel seu propi reclam (e.g. enregistrament del seu cant)
9	Desconegut





ESTAT REPRODUCTOR

Codi	Estat reproductor (placa incubatriu/protuberància cloacal)
0	No presenta placa incubatriu (ni mostra signes de tenir un ou)
1	Sense plomes a la zona ventral, però amb la pell llisa. Color vermell fosc
2	Vascularització evident. Algunes arrugues (gruixudes) i una mica de fluid sota la pell. Color rosa pàl·lid
3	Vascularització màxima. Moltes arrugues (gruixudes) i fluid. Color rosa pàl·lid
4	En regressió. Gairebé sense fluid ni vascularització. Aspecte sec, arrugues fines i resseques
5	Les plomes comencen a créixer de nou
6	Signes de tenir un ou
7	Protuberància cloacal pronunciada (més estreta o igual d'ample a la base que al centre)
9	Desconegut

TIPUS DE CAPTURA

Codi	Tipus	Subtipus
N	Captura normal	Sense concretar subtipus
NL	Captura normal	Aparentment local
NP	Captura normal	En pas, no local
NC	Captura normal	Criant
NH	Captura normal	Aparentment hivernant
ND	Captura normal	En dormidor
NM	Captura normal	Al mar
NA	Captura normal	En una agrupació de muda
NR	Captura normal	En colònia de cria, no necessàriament criant
Z	Captura normal: amb dues anelles	Ocell controlat amb dues anelles metàl·liques diferents
C	Captura normal: anella canviada	Anella canviada
S	Captura normal: sense anellar	Ocell que no es pot anellar
RC	Centre de recuperació	Criat en captivitat
RM	Centre de recuperació	Mantingut més de 24 h en captivitat abans de ser alliberat
RT	Centre de recuperació	Transportat al lloc d'alliberament (>10 km)
R	Centre de recuperació	Sense concretar subtipus
B	Baixa no anellada	Mort abans de ser anellat (baixa no anellada)
E	Anella extraviada	Anella extraviada o eliminada

MÚSCUL

					9
Aspecte	Depressit	Ni depressit ni arrodonit	Lleugerament arrodonit	Arrodonit	Desconegut
Forma	Còncava	Recta	Convexa	Molt convexa	
Quilla	Molt prominent	Prominent	No prominent	Per sota o en línia recta amb els músculs	

INTENSITAT DE LA MUDA

Codi	Intensitat
0	No ha començat la muda
1	<20 plomes del cos en creixement (en muda)
2	<1/3 de plomes del cos en creixement (en muda)
3	>1/3 de plomes del cos en creixement o amb plomes de vol en creixement (en muda)
4	Primàries en muda completa activa
5	Muda finalitzada (hagi renovat o no tot el plomatge)
6	Primàries juvenils en creixement (només juvenils)
7	No es troba en muda activa però es desconeix si no l'ha començat o bé si ja l'ha acabat
9	Desconegut